

1. Një buxhetë me lule kushton 720 lekë. Çmimi i buxhetës pas rritjes me 20% është:
- A) 576
B) 864
C) 900
D) 964
2. Një shitëse plotësoi për një klient fakturën me 2670.5 lekë. Gabimisht ajo kishte ndërmuar vendin e shifrës 6 me shifrën 7. Sa lekë më pak pagoi klienti? 1 pikë
- A) 80 lekë
B) 90 lekë
C) 100 lekë
D) 110 lekë
3. y është në përpjesëtim të zhdrejhtë me x , dhe $y = 12$ kur $x = 2$. Formula që shpreh këtë lidhje është: 1 pikë
- A) $y = 6x$
B) $y = 24x$
C) $y = \frac{24}{x}$
D) $y = \frac{6}{x}$
4. Shprehja $y(y+3) - 2y(y+1)$ është e njëvlefshme me: 1 pikë
- A) 0
B) $y^2 + y$
C) $3y$
D) $-y^2 + y$
5. Nëse $9^{12} = 27^x$, vlera e x është: 1 pikë
- A) 3
B) 4
C) 8
D) 9
6. Numri i mikrobeve të pranishme në një kampion laboratorik pas d -ditësh mund të përfaqësohet nga formula $n = 400 \cdot 3^d$. Numri fillestar i mikrobeve të pranishme në këtë kampion është: 1 pikë
- A) 200
B) 400
C) 1200
D) 3600
7. Thyesa $\frac{4+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$ është e barabartë me: 1 pikë
- A) $11 - 6\sqrt{3}$
B) $5 + 2\sqrt{3}$
C) $11 + 6\sqrt{3}$
D) $5 - 2\sqrt{3}$
8. Vlera e shprehjes $\sqrt{28} \cdot \sqrt{70}$ është: 1 pikë
- A) $14\sqrt{10}$
B) $14\sqrt{5}$
C) $14\sqrt{2}$
D) 14
9. Elementi më i vogël i bashkësisë $[3, 4] \cap [-3, 4]$, është: 1 pikë
- A) -3
B) 0
C) 3
D) 4

10. Vlera e $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{3} = 1$ është:

- A) 5
 - B) 4
 - C) 3
 - D) 1
- 1 pikë

11. Një fustan kushton 3600 lekë. Çmimi i fustanit nëse bëhet ulje me 15% do të jetë:

- A) 3060
 - B) 3000
 - C) 540
 - D) 150
- 1 pikë

12. Sa % (e rrumbullakosur), e figurës së mëposhtme është e ngjyrosur nëse të gjithë trekëndëshat e formuar janë barabrinjës ?



- A) 70%
 - B) 50%
 - C) 44%
 - D) 30%
- 1 pikë

13. Zgjidhje e inekuacionit $\frac{5x-2}{3} \leq 6$ është bashkësia:

- A) $]-\infty; 5]$
 - B) $]4; +\infty[$
 - C) $]-\infty; 4]$
 - D) $]-\infty; -4]$
- 1 pikë

14. Një stadium e ka syprinën ku do të ulen tifozët 120 000 m². Çdo tifoz i duhet 1,5m² hapsirë për t'u ulur. Sa është numri i tifozëve që mund të ulen në stadium?

- A) 80000
 - B) 48000
 - C) 40000
 - D) 30000
- 1 pikë

15. Zgjidhje e inekuacionit $7 \leq 3x - 2 \leq 19$ është bashkësia:

- A) $]3; 7[$
 - B) $]7; +\infty[$
 - C) $[3; 7]$
 - D) $]-\infty; 3[$
- 1 pikë

16. Pika A(x, -1) është pikë e drejtëzës $3x - 2y + 1 = 0$. Vlera e x është:

- A) -1
 - B) -2
 - C) -3
 - D) -5
- 1 pikë

17. Erda bleu aksione që kushtojnë 4 000 000 lekë. Vlera, V, e aksioneve është zhvlerësuar me 0.04% çdo vit. Formula e cila jep vlerën, V, të aksioneve pas dy vjetësh është:

- A) $V = (4000000 - 0,04)^2$
 - B) $V = 4000000 \cdot (1,04)^2$
 - C) $V = 4000000 \cdot (0,9996)^2$
 - D) $V = 4000000 \cdot (0,96)^2$
- 1 pikë

18. Grafiku i funksionit $y = \frac{2}{x}$ kalon nga pika me koordinata:

- A) (4; 2)
 - B) (2; 4)
 - C) (2; 1)
 - D) (1; 2)
- 1 pikë

19. Durimi është duke lexuar një libër enciklopedik që ka 2019 faqe. Nëse y është numri i faqeve të lexuara deri më 15 qershor, atëherë sa faqe i mbetën për të lexuar në muajin qershor? 1 pikë
- A) 6 faqe
B) 16 faqe
C) 18 faqe
D) 26 faqe
20. Shuma e dy numrave është 40. Numri më i madh është 8 më pak se 3-fishi i më të voglit. Sa është diferenca e numrave? 1 pikë
- A) 16
B) 15
C) 14
D) 13
21. Simetrikja e pikës A(-2;3) në lidhje me boshtin OX është: 1 pikë
- A) (-2; 3)
B) (-2;-3)
C) (2; 3)
D) (2;-3)
22. Treshja e numrave që paraqet gjatësitë e brinjëve të një trekëndëshi kënddrejtë është: 1 pikë
- A) $1; 2\sqrt{2}; 3$
B) $3^2; 4^2; 5^2$
C) 3; 4; 6
D) 6; 8; 12
23. 25% e lapsave të një kutie janë shitur. Duke ditur që kanë mbetur 60 lapsa në kuti, numri i lapsave që janë shitur është: 1 pikë
- A) 12
B) 15
C) 18
D) 20
24. Për 1 sec një postier hedh 3 hapa. Sa hapa do hedhë postieri për 60 minuta? 1 pikë
- A) 10 000
B) 10 500
C) 10 800
D) 10 900
25. Jepet numri $a = \frac{30}{n}$ për $n \in \mathbb{N}$. Sa vlera të $n \in \mathbb{N}$ janë të tilla që $a \in \mathbb{N}$? 1 pikë
- A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
26. Nëse 7% e numrit x është 63, vlera e x-it është: 1 pikë
- A) 9000
B) 900
C) 100x
D) 1000
27. Trajta standarde e numrit 85000 është: 1 pikë
- A) $85 \cdot 10^2$
B) $8.5 \cdot 10^3$
C) $8.5 \cdot 10^4$
D) $8.5 \cdot 10^5$
28. Vlera e $\frac{8^6}{4^3}$ është: 1 pikë
- A) 8
B) 16
C) 32
D) 64

29. Shpenzimet e ndërtimit të një shkolle fillore janë në raportin:

puna : materialet : tarifa profesionale = 7 : 5 : 2.

Shpenzimet e materialeve janë 540 000 lekë më shumë sesa shuma e paguar për tarifat profesionale. Kostoja totale për ndërtimin e kësaj shkolle është:

1 pikë

- A) 180 000 lekë.
- B) 900 000 lekë.
- C) 1 260 000 lekë.
- D) 2 520 000 lekë.

30. Një palestër përdor në një vit $1,568 \cdot 10^4$ njësi elektrike gjithsej. Secili prej anëtarëve të palestërës përdor mesatarisht $4,9 \cdot 10^4$ njësi elektrike në vit. Numri i anëtarëve në këtë palestër i dhënë në trajtë standarde është:

1 pikë

- A) $32 \cdot 10^2$
- B) $3,2 \cdot 10^3$
- C) $0,32 \cdot 10^5$
- D) $3,2 \cdot 10^7$

31. Vëllimi që shpreh të njëjtën sasi me 15 cm^3 është:

1 pikë

- A) 15000 mm^3
- B) 15 mm^3
- C) $0,0015 \text{ mm}^3$
- D) 150 mm^3

32. Nëse një makinë ecën me shpejtësi 120 km / orë , pas 50 minutash ajo përshkon:

1 pikë

- A) 40 km
- B) 60 km
- C) 80 km
- D) 100 km

33. Aldo bleu një shtëpi. Pas dy vitesh ai ja shiti shtëpinë Gentës. Nga shitja ai nxorri një fitim prej 25%. Më pas, Genta shiti shtëpinë për 9 850 500 lekë. Ajo bëri një humbje prej 10%. Aldo për blerjen e shtëpisë ka paguar:

1 pikë

- A) 10 945 000 lekë
- B) 9 000 000 lekë
- C) 8 800 000 lekë
- D) 8 756 000 lekë

34. Anijet A dhe B lënë portin në të njëjtën kohë. Anija A lundron me 8 km / orë me kurs 120° . Anija B lundron me kurs 195° . Pas 90 minutash, kursi nga A tek B është 255° . Shpejtësia e anijes B është:

1 pikë

- A) $\frac{16\sqrt{6}}{9} \text{ km / orë}$
- B) $\frac{8\sqrt{6}}{3} \text{ km / orë}$
- C) $\frac{8\sqrt{6}}{6} \text{ km / orë}$
- D) $\frac{\sqrt{6}}{9} \text{ km / orë}$

35. Këndi që vërteton ekuacionin $\sin x - \cos x = 0$ në $[0; 180^\circ]$ është:

- A) 45°
- B) 90°
- C) 135°
- D) 180°

- A) $(x-6)(x-4)$
 B) $(x-8)(x-3)$
 C) $(x+6)(x+4)$
 D) $(x+8)(x+3)$

46. Kufiza e 100-të e vargut $T(n) = 2n + 5$ është:

- A) 25
 B) 100
 C) 105
 D) 205

1 pikë

47. Mbetja e pjesëtimit të polinomit $P(x) = 2x^2 + 4x^2 + 2x + 6$ me $(x+1)$ është:

- A) 19
 B) 6
 C) 1
 D) -7

1 pikë

48. Kufiza e n -të e vargut 5, 9, 13, 17 ... është:

- A) $4n - 1$
 B) $4n$
 C) $3n + 2$
 D) $4n + 1$

1 pikë

49. Jepet funksioni $f(x) = px^2 + (10-p)x + \frac{5}{4}p - 5$ ku $p > 0$. Vlera e p -së, që ekuacioni $f(x) = 0$ të ketë dy rrënjë reale të barabarta është:

- A) -5
 B) 5
 C) 10
 D) 25

1 pikë

50. Ngjarjet A dhe B janë të pavarura. Jepen probabilitetet $P(A) = 0,5$ dhe $P(B) = 0,3$. $P(A \text{ dhe } B)$ është:


- A) 0,15
 B) 0,2
 C) 0,8
 D) 1,5

1 pikë

51. A dhe B janë dy figura të ngjashme. Figura B është përfutur si zmadhim i figurës A me koeficient 1,5. Vlera e këndit x është:

- A) 81°
 B) 54°
 C) 36°
 D) 18°


1 pikë



52. ABC dhe BDA janë trekëndësha kënddrejtë. Jepen $AB = 6,5$ cm dhe $BD = 4$ cm. Gjatësia e brinjës CD është:

- A) 5,12
 B) 3,125
 C) 6,245
 D) 25,77

1 pikë



53. Katërkëndëshi ABCD është brendashkruar në një rreth si në figurë. Nëse këndi $ABC = 71^\circ$ dhe këndi $ACD = 26^\circ$, masa e këndit DAC të shënuar me x është:

- A) 26°
 B) 45°
 C) 83°
 D) 90°

1 pikë



- A) 10
- B) 11
- C) 12
- D) 13

Në një kuti ndodhen 5 sfera të kuqe e 9 sfera të zeza. Zgjedhim rastësisht një sferë nga kutia, mbajmë shënim ngjyrën dhe e kthejmë përsëri në kuti. Më pas ruajmë rastësisht një sferë tjetër.

Për të dhënat e mësipërme rretho përgjigjen e saktë për pyetjet 55, dhe 56.

1 pikë

55. Probabiliteti që të dy sferat të jenë me ngjyra të ndryshme është:

- A) $\frac{45}{196}$
- B) $\frac{45}{182}$
- C) $\frac{45}{98}$
- D) $\frac{45}{91}$

1 pikë

56. Probabiliteti që të paktën njëra nga sferat është me ngjyrë të zezë është:

- A) $\frac{171}{196}$
- B) $\frac{162}{182}$
- C) $\frac{45}{196}$
- D) $\frac{81}{196}$

Në tabelën e mëposhtme, jepet koha e pritjes për një shëtitje me anije.

Koha e pritjes, t (min)	Denduria
$0 < t \leq 5$	6
$5 < t \leq 10$	5
$10 < t \leq 15$	12
$15 < t \leq 20$	14
$20 < t \leq 25$	6
$25 < t \leq 30$	2

Për të dhënat e mësipërme rretho përgjigjen e saktë për pyetjet 57, 58, 59 dhe 60.

57. Norma mesatare (e dhënë me vlerë të saktë) e kohës së pritjes për shëtitjen me anije është:

1 pikë

- A) 14,16
- B) $14,1\bar{6}$
- C) 14,17
- D) $16,6\bar{6}$

58. Klasa që përmban mesoren është:

1 pikë

- A)]25 – 30]
- B)]20 – 25]
- C)]15 – 20]
- D)]10 – 15]

59. Denduria e grumbulluar e pritjes për një shëtitje me anije deri në 20 minuta është:

1 pikë

- A) 22
- B) 23
- C) 37
- D) 45

60. Klasa modale është:

1 pikë

- A)]10 – 15]
- B)]15 – 20]
- C)]20 – 25]
- D)]25 – 30]